

Anlage 3a

Teilnahmevoraussetzungen Kind

Folgende Kriterien müssen beim zu behandelnden Kind zum Zeitpunkt der Erbringung der Tonsillotomie vorliegen:

- Diagnose Tonsillenhyperplasie (ICD-10 J35.1 bzw. J35.3)
- Das Kind hat mindestens das 2. Lebensjahr vollendet und das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet. In begründeten Ausnahmen ist die Teilnahme möglich, solange das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet ist.
- Anamnese:
 - obstruktive Schlafapnoe und/oder
 - nachgewiesene Gedeihstörung und/oder
 - nachgewiesenes gestörtes Ess- u. Trinkverhalten und /oder
 - chronische Mittelohrentzündung und/oder
 - Paukenerguss und/oder
 - erfolglose konservative Therapie beim HNO-Arzt und /oder
 - gute Luxierbarkeit (nicht Verbacken) der Tonsillen.

Folgende Kontraindikationen dürfen nicht vorliegen:

- Retonsillotomie
- mehr als 3 antibiotikapflichtige Tonsillitiden im Jahr vor der Operation und mehr als 4 antibiotikapflichtige Tonsillitiden seit der Geburt des Patienten
- schwerwiegende Nebenerkrankungen
- akute Tonsillitis
- submuköse Gaumenspalte
- Nasen-Rachen-Fibrom
- Druckschmerzhaftigkeit der Tonsillen
- fehlende Luxierbarkeit
- Exprimat sichtbar