

Anlage 3a

Teilnahmevoraussetzungen Kind

Folgende Kriterien müssen beim zu behandelnden Kind zum Zeitpunkt der Erbringung der Tonsillotomie erfüllt sein:

- Diagnose Tonsillenhyperplasie (ICD-10 J35.1 oder J35.3)
- Das Kind hat mindestens das 2. Lebensjahr vollendet und das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet.
- Anamnese:
 - Obstruktive Schlafapnoe und/oder
 - Nachgewiesene Gedeihstörung und/oder
 - Nachgewiesenes gestörtes Ess- u. Trinkverhalten und/oder
 - Chronische Mittelohrentzündung und/oder
 - Paukenerguss und/oder
 - Erfolgreiche konservative Therapie beim HNO-Arzt und/oder
 - Gute Luxierbarkeit (nicht Verbacken) der Tonsillen

Folgende Kontraindikationen dürfen **nicht** vorliegen:

- Retonsillotomie
- Mehr als 3 antibiotikapflichtige Tonsillitiden im Jahr vor der Operation und mehr als 4 antibiotikapflichtige Tonsillitiden seit der Geburt der Patienten
- Schwerwiegende Nebenerkrankungen
- Akute Tonsillitis
- Submuköse Gaumenspalte
- Nase-Rachen-Fibrom
- Druckschmerzhaftigkeit der Tonsillen
- Fehlende Luxierbarkeit
- Exprimat sichtbar