

Liste der zulässigen Mittel Sprechstundenbedarf

Anlage I: Gem. § 4 Abs. 1 Vereinbarung über vertragsärztl. Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.01.2014

Die rechtlichen und vertraglichen Grundsätze zur Verordnung von Arzneimitteln gelten auch für die Verordnung von Arzneimitteln im Sprechstundenbedarf (siehe auch § 4 Abs. 6 dieser Vereinbarung).

Als Sprechstundenbedarf zulässige Mittel:

Wirkstoffe für Notfallpatienten und Patienten mit akuten Schmerz- und Erregungszuständen sowie in unmittelbarem, ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung in der hier angegebenen Zubereitungs- und Darreichungsform. Eine Verordnung über Sprechstundenbedarf im Zusammenhang mit einer Serienbehandlung ist nach § 4 Abs. 2 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgeschlossen. Retard-Zubereitungen sind von der Verordnung im Sprechstundenbedarf grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Ausnahmen wird bei den Anmerkungen hingewiesen.

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Analgetika / Antirheumatika | Ammoniumbituminosulfonat | | | | | | | | X | Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbandwechsel und/oder Iontophorese |
| | ASS (Acetylsalicylsäure) | X | X | | | | | | | |
| | ASS (Acetylsalicylsäure) + Codein | | X | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|---------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Buprenorphin | X | X | | | | | | | Oral: Nicht zur Substitutionstherapie bei Opiatabhängigkeit |
| | Dexketoprofen | X | | | | | | | | Nur zur i. v.-Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen |
| | Diclofenac | X | X | | X | | | X | | Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. Parenteral: Nur in besonderen Fällen. Externa: Nur im Zusammenhang mit Verbänden (Erstanlage und Verbandwechsel) und/oder Iontophorese |
| | Diclofenac + Codein | | X | | | | | | | |
| | Etoricoxib | | X | | | | | | | Nur zur postoperativen Schmerztherapie nach Zahn-Op., nur MKG-Chirurgie (in diesem Zusammenhang auch für Anästhesisten) |
| | Ibuprofen | | X | | X | | | | | Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. |
| | Metamizol | X | X | | X | | | | | Parenteral: Nur in besonderen Fällen. |
| | Morphin | X | X | | | | | | | Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. |
| | Nalbuphin | X | | | | | | | | Nur zur Anästhesie bei Kindern |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|----------------------|------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Naproxen | | X | | | | | | | |
| | Oxycodon | X | X | | | | | | | Nur bei bekanntem Versagen anderer Opiate |
| | Paracetamol | X | X | | X | | | | | Oral: Soft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen |
| | Paracetamol + Codein | | X | | X | | | | | Oral: Soft nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen |
| | Pethidin | X | | | | | | | | |
| | Piritramid | X | | | | | | | | |
| | Tilidin + Naloxon | | X | | | | | | | Oral: Retardformen nur im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. |
| | Tramadol | X | X | | | | | | | Oral: keine Retardformen |
| Antiallergika | Adrenalin (Epinephrin) | | | | | | X | | | Infectokrupp, akute stenosierende Laryngotracheitis |
| | Cetirizin | | X | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|------------------------|-------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Clemastin | X | | | | | | | | Unter Kontrolle der Herzfrequenz |
| | Chlorphenoxamin | | | | | | | X | | Nur im Zusammenhang mit Pricktest |
| | Dimetinden | X | X | | | | | | | Oral:Ausschließlich Tropfen und nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen |
| | Promethazin | | | | | | | | | Siehe Psychopharmaka |
| Antiarrhythmika | Adenosin | X | | | | | | | | Siehe auch Diagnostika |
| | Ajmalin | X | | | | | | | | |
| | Amiodaron | X | | | | | | | | |
| | Flecainid | X | | | | | | | | |
| | Ipratropiumbromid | X | | | | | | | | |
| | Lidocain | X | | | | | | | | |
| | Orciprenalin | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|---|-------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|--|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Antiasthmatika / Broncholytika | Adrenalin (Epinephrin) | | | | | | X | | | Siehe auch Antihypotonika |
| | Beclometason | | | | | | X | | | Nur zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, nur Dosieraerosole |
| | Fenoterol | | | | | | X | | | Siehe Gynäkologika |
| | Fenoterol + Ipratropiumbromid | | | | | | X | | | |
| | Ipratropiumbromid | | | | | | X | | | |
| | Kochsalzlösung zur Inhalation | | | | | | X | | | Nur physiologische Kochsalzlösung |
| | Reproterol | X | | | | | | | | |
| | Salbutamol | | X | | | | X | | | Oral nur Lösungen; nur für Patienten, die nicht symptomorientiert mit inhalativen β_2 -Sympathomimetika behandelt werden können |
| Terbutalin | X | | | | | | | | | |
| Theophyllin | X | | | | | | | | Nur als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------|-----------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Antibiotika | Amoxicillin | | X | | | | | | | |
| | Amoxicillin + Clavulansäure | X | X | | | | | | | Oral nur zur Behandlung ambulant erworbener Pneumonien bei Patienten mit Risikofaktoren |
| | Ampicillin | X | | | | | | | | |
| | Azithromycin | | X | | | | | | | |
| | Cefaclor | | X | | | | | | | |
| | Cefazolin | X | | | | | | | | |
| | Cefotaxim | X | | | | | | | | Nur zur Meningitisbehandlung von Neugeborenen/Kindern und zur Behandlung der akuten Peritonitis |
| | Cefotiam | X | | | | | | | | Streichung, da außer Handel |
| | Ceftriaxon | X | | | | | | | | |
| | Cefuroxim/-axetil | X | X | | | | | | | Intrakameral nur in besonderen Fällen! |
| Ciprofloxacin | X | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|-------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Clindamycin | X | X | | | | | | | |
| | Cotrimoxazol | | X | | | | | | | |
| | Doxycyclin | X | | | | | | | | |
| | Erythromycin | X | | | | | | | | |
| | Gentamicin | X | | | | | | X | | Extern nur als Ketten |
| | Metronidazol | X | X | | | X | | | | Vaginalsupp. 1000mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung |
| | Penicillin G | X | | | | | | | | |
| | Penicillin V | | X | | | | | | | |
| | Piperacillin-Tazobactam | X | | | | | | | | Nur zur Initialtherapie der febrilen Neutropenie, nur onkologisch tätige Ärzte |
| | Rifampicin | | X | | | | | | | Nur zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|------|--|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Antidiabetika | Insulin, schnellfreisetzend | X | | | | | | | | Analoga nur bei Insulinresistenz/Allergie |
| Antidiarrhoika | Elektolyte + Glucose | | X | | | | | | | Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen |
| Antidota | Acetylcystein (NAC) | X | | | | | | | | Nur als Antidot |
| | Atropin | X | | | | | | | | |
| | Aktivkohle | | X | | | | | | | |
| | Biperiden | X | | | | | | | | Siehe auch Parkinsonmittel |
| | Dimethyl-aminophenol | X | | | | | | | | |
| | Dimethylsulfoxid (DMSO) | | | | | | | X | X | Nur zur Paravasatbehandlung |
| | Dimeticon | | X | | | | | | | Nur bei Spülmittelvergiftungen, nur Suspensionen; siehe auch Diagnostika |
| | Ethanol Konzentrat | X | | | | | | | | Nur bei Methanolvergiftung oder zur Delirprophylaxe |
| | Flumazenil | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|--------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Hyaluronidase | X | | | | | | | | Subcutan: Nur zur Paravasatbehandlung |
| | Ipecacuanha-Sirup | | X | | | | | | X | Nur als NRF-Rezeptur erhältlich |
| | Lipid-Emulsion 20% | X | | | | | | | | Nur für Anästhesisten bei Lokalanästhetika-Intoxikation |
| | NAC | | | | | | | | | Siehe Acetylcystein |
| | Naloxon | X | | | | | | | | |
| | Natriumthiosulfat | X | | | | | | | | |
| | Neostigmin | X | | | | | | | | Siehe auch Cholinergika |
| | Obidoxim | X | | | | | | | | |
| | Orciprenalin | X | | | | | | | | Siehe auch Antiarrhythmika |
| | Physostigmin | X | | | | | | | | |
| | Protamin | X | | | | | | | | |
| | Pyridostigmin | X | | | | | | | | Siehe auch Cholinergika |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--|-------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Simeticon | | X | | | | | | | Siehe Dimeticon |
| | Sugammadex | X | | | | | | | | Nur als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade. |
| | Toluidinblau (Tolonium) | X | | | | | | | | |
| Antiemetika / Antivertiginosa | Dimenhydrinat | X | X | | X | | | | | Rektal: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen |
| | Diphenhydramin | | X | | X | | | | | Rektal: Nur Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen |
| | Domperidon | | X | | | | | | | Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jungen Patienten |
| | Droperidol | X | | | | | | | | |
| | Metoclopramid | X | X | | X | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-----------------------|---------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Ondansetron | X | X | | | | | | | Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie. |
| | Promethazin | | | | | | | | | Siehe Psychopharmaka |
| | Sulpirid | | | | | | | | | Siehe Psychopharmaka |
| | Tropisetron | X | | | | | | | | Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, nicht zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie. |
| Antiepileptika | Clonazepam | X | | | | | | | | |
| | Diazepam | X | | | X | | | | | Siehe auch Hypnotika/ Tranquillantien |
| | Phenobarbital | X | | | | | | | | |
| | Phenytoin | X | | | | | | | | |
| | Valproinsäure | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------------|---------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|----------------------------------|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Antihämorrhagika | Menadion | | | | | | | | | Siehe Phytomenadion |
| | Phyllochinon | | | | | | | | | Siehe Phytomenadion |
| | Phytomenadion | X | X | | | | | | | |
| | Tranexamsäure | X | X | | | | | | | |
| | Vitamin K1 | | | | | | | | | Siehe Phytomenadion |
| Antihypertonika | Clonidin | X | X | | | | | | | |
| | Dihydralazin | X | | | | | | | | |
| | Metoprolol | X | | | | | | | | |
| | Nifedipin | X | X | | | | | | | Oral: Keine Retardformen! |
| | Nitrendipin | | X | | | | | | | Oral: Nur Phiolen |
| | Pindolol | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------------|--|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Sotalol | X | | | | | | | | |
| | Urapidil | X | | | | | | | | |
| | Verapamil | X | | | | | | | | |
| Antihypoglykämika | Glucagon | X | | | | | | | | |
| | Glucose | X | | | | | | | | |
| Antihypotonika | Adrenalin (Epinephrin) | X | | | | | | | | Keine Autoinjektoren Siehe auch Antiallergika |
| | Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin | X | | | | | | | | Z. B. Akrinor |
| | Dobutamin | X | | | | | | | | |
| | Dopamin | X | | | | | | | | |
| | Ephedrin | X | | | | | | | | |
| | Epinephrin | | | | | | | | | Keine Autoinjektoren Siehe Adrenalin |
| | Noradrenalin | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|------------------------------|---|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Antikoagulantia | Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide | X | | | | | | | | Nur für die ambulante Anwendung zugelassene Wirkstoffe und Wirkstärken Siehe auch Verordnungsforum 7 |
| Antitussiva | Codein | | X | | | | | | | Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo |
| | Dihydrocodein | | X | | | | | | | Nur zum Behandlungsbeginn als Testdosis – siehe Fachinfo |
| Betarezeptorenblocker | | | | | | | | | | Siehe Antihypertonika |
| Calciumantagonisten | | | | | | | | | | Siehe Antihypertonika |
| Cholinergika | Neostigmin | X | | | | | | | | Siehe auch Antidota |
| | Pyridostigmin | X | | | | | | | | Siehe auch Antidota |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Corticoide | Corticoide | X | X | | X | | | | | <p>parenteral, max. Anzahl Ampullen pro Arzt und Quartal: Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/Anästhesisten: 100 Amp.; andere Fachgruppen: 50 Amp.;</p> <p>parenteral ohne Mengengrenzung: wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen</p> <p>oral Tabletten: max. 100 Stück pro Arzt und Quartal</p> <p>oral flüssig: max. 90 ml pro Arzt und Quartal</p> |
| Dermatika | Alkoholische Lösungen | | | | | | | | | Siehe Desinfektionsmittel |
| | Aluminiumchlorid | | | | | | | X | X | Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich |
| | Ammoniumbituminosulfonat | | | | | | | X | | Siehe Analgetika/Antirheumatika |
| | Argentum nitricum | | | | | | | X | X | Siehe auch Rhinologika |
| | Betamethason (+ Antiseptika) | | | | | | | X | | |
| | Betamethason + Clotrimazol | | | | | | | X | | Nur Dermatologen |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|----------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Betamethason + Fusidinsäure | | | | | | | X | | Nur Dermatologen, HNO- und Kinderärzte |
| | Betamethason + Gentamycin | | | | | | | X | | Nur HNO-Ärzte, max. 1x50g/Arzt und Quartal |
| | Chlorphenoxamin | | | | | | | X | | Nur im Zusammenhang mit Pricktest |
| | Clobetasol (+ Antiseptika) | | | | | | | X | | |
| | Dexpanthenol | | | | | | | X | | Nur Urologen und Kinderärzte |
| | Eisen(III)chlorid | | | | | | | X | X | Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich |
| | Eosin-Dinatrium | | | | | | | X | X | Lösung; nur als Rezeptur erhältlich |
| | Ethacridinlactat | | | | | | | X | | |
| | Framycetin + Lidocain | | | | | | | X | | Extern: Nur Kegel |
| | Fusidinsäure | | | | | | | X | | Nur zur Akuttherapie einer Staphylokokken-Infektion |
| | Hydrocortison (+ Antiseptika) | | | | | | | X | | Rezepturen: Siehe § 4 Abs. 1 SpBV |
| | Imiquimod | | | | | | | X | | Nur zur Erstanwendung bei aktinischer Keratose |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Mupirocin | | | | | | | X | | |
| | Natriumbituminosulfonat | | | | | | | X | | |
| | Phenol | | | | | | | X | X | Nur als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix (Rezeptur) |
| | Podophyllotoxin 5 mg | | | | | | | X | | Nur wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist. |
| | Polihexanid | | | | | | | X | X | Nur Arzneimittel |
| | Prednicarbat (+ Antiseptika) | | | | | | | X | | |
| | PVP-Iod | | | | | | | X | | |
| | Silbernitrat | | | | | | | | | Siehe Argentum nitricum |
| | Sulfadiazin-Silber | | | | | | | X | | |
| | Triamcinolon + Zinkoxid | | | | | | | X | | |
| | Trichloressigsäure | | | | | | | X | X | Nur zur Anwendung durch den Arzt; nur als Rezeptur erhältlich |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--|---|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Salpetersäure + Essigsäure + Oxalsäure + Milchsäure + Kupfer(II)-nitrat | | | | | | | | | Nur , wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist, z. B. Solcoderman |
| | Zinkoxidschüttelmixtur | | | | | | | X | | |
| Desinfektionsmittel und Hautentfettungs- mittel | Benzin DAB (Wundbenzin) | | | | | | | X | | |
| | Chlorhexidin | | | | | | | X | | Nur für Augenärzte und für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen |
| | Desinfektionsmittel | | | | | | | X | | Nur Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion am Patienten, keine Mittel zur Hände-, Inst- rumenten- und Flächendesinfektion |
| | Ethanol 70% | | | | | | | X | | Nur für augen- und HNO-ärztliche sowie für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistun- gen und nur in kleinen Mengen, max. 500 ml pro Arzt und Quartal |
| | Isopropanol 70% | | | | | | | X | | |
| | Wasserstoffperoxid 3% | | | | | | | X | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------|-------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Diagnostika | Adenosin | X | | | | | | | | Siehe auch Antiarrhythmika |
| | Allergie-Testsubstanzen | | | | | | | | | Nur für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), für die Basisdiagnostik mit der Leistung nach EBM abgegolten |
| | Alprostadil | | | | | | | | | Nur als Diagnostikum zur intrakavernösen Applikation |
| | Baclofen | X | | | | | | | | Nur als Diagnostikum (0,05 mg Amp.) |
| | Carbachol | | | | | | X | | X | Nur zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität (Rezeptur) |
| | Choriongonadotropin | X | | | | | | | | Nur zur Diagnostik in der Pädiatrie/Andrologie |
| | Corticotropin (CRH) | X | | | | | | | | |
| | CRH | | | | | | | | | Siehe Corticotropin |
| | Dimeticon | | X | | | | | | | Nur als Entgasungsmittel zur Vorbereitung diagnostischer Maßnahmen |
| | GHRH | | | | | | | | | Siehe Somatotropin |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|--------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Glucose-Monohydrat | | X | | | | | | | Nur für Glucoseprobetrunke, auch als Rezeptur (55 g Glucose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose); keine als Lebensmittel deklarierten Produkte |
| | Gonadorelin (LHRH) | X | | | | | | | | |
| | LHRH | | | | | | | | | Siehe Gonadorelin |
| | L-Arginin-HCl | X | | | | | | | | Nur für die quantitative Bestimmung von GHG/STH |
| | Methacholin | | | | | | X | | | |
| | Methylcellulose | | X | | | | | | | Als Diagnostikum zur MRT-Sellink-Untersuchung |
| | Natriumperchlorat | | X | | | | | | | Siehe auch Schilddrüsen-therapeutika |
| | Neostigmin | X | | | | | | | | Siehe auch Cholinergika |
| | Protirelin | X | | | | | X | | | |
| | Regadenoson | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|---------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Secretin | X | | | | | | | | |
| | Simeticon | | X | | | | | | | Siehe Dimeticon |
| | Somatorelin (GHRH) | X | | | | | | | | |
| | Tetracosactid | X | | | | | | | | Diagnostik der NNR-Funktion, keine Depotform |
| | Thyreoliberin (TRF) | X | | | | | X | | | Inhalativ: Nasale Anwendung |
| | TRF | | | | | | | | | Siehe Thyreoliberin |
| | Tuberkulin | X | | | | | | | | Intradermale Verabreichung |
| | Urinteststreifen | | | | | | | | | Nur zur ausschließlichen Bestimmung von Glucose und/oder Protein und/oder pH-Wert; andere Parameter sind mit der Leistung abgegolten |
| Diuretika | Furosemid | X | X | | | | | | | Keine retardierten Darreichungsformen |
| | Kalium-canrenoat | X | | | | | | | | |
| | Torasemid | X | X | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|----------------------|-----------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Fibrinolytika | Alteplase | X | | | | | | | | Nur zur thrombolytischen Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern (z. B. Actilyse Cathflo 2 mg). |
| Gase | | | | | | | | | | Alle Gase ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten |
| | Aer medicalis | | | | | | | X | | |
| | Kohlendioxid | | | | | | | | X | Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen |
| | Narkosegase | | | | | | | | | Siehe auch Narkosemittel |
| | Sauerstoff | | | | | | | X | | |
| | Stickstoff | | | | | | | | X | Nur zur Kryochirurgie, nicht zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen |
| Gichtmittel | Colchicin | | X | | | | | | | |
| Gynäkologika | Antibiotische Gynäkologika | | | | | | | X | | Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal |
| | Antimykotische Gynäkologika | | | | | | | X | | Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|---------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Estriol | | | | | X | | | | Nur zur Erstanwendung nach vaginalen Operationen bei Frauen mit Estrogenmangel und bei Pessarwechsel |
| | Dinoproston | | | | | X | | | | |
| | Fenoterol | X | | | | | | | | |
| | Gemeprost | | | | | X | | | | außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung! |
| | Gleitgele mit Lokalanästhetikum | | | | | | | | | Siehe auch medizinisch technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Urologie; |
| | Hexetidin | | | | | X | | | | |
| | Methylergometrin | X | | | | | | | | |
| | Metronidazol | | | | | | | | | Siehe Antibiotika |
| | Oxytocin | X | | | | | | | | Siehe auch Hypophysenhormone |
| | PVP Iod (Povidon-Iod) | | | | | X | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|---------------------------------------|---------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| H2-Rezeptorenblocker | Cimetidin | X | | | | | | | | Nur als Antihistaminikum: Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histamin-bedingten Allergien und Intoleranzen |
| | Ranitidin | X | | | | | | | | Nur zur Narkosevorbehandlung vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration |
| Hämorrhoidenmittel | Polidocanol | X | | | | | | | | Submuköse Anwendung; Siehe auch Venenmittel , als Rezeptur wirtschaftlicher |
| | Lidocain | | | | X | | | | | |
| | Cinchocain | | | | X | | | | | |
| Homöopathika / Anthroposophika | | | | | | | | | | Ausschließlich Globuli zur Erstanwendung am Patienten. Bis zu 15 Kleinstpackungen pro Arzt und Quartal. Nur in Deutschland zugelassene Arzneimittel, keine Einzelimporte. |
| Hypnotika / Tranquillantien | Chloralhydrat | | | | X | | | | | |
| | Diazepam | X | X | | X | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------------|-----------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|--|----------|------------------------------|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | | |
| | Lorazepam | X | X | | | | | | | | |
| | Lormetazepam | | X | | | | | | | | |
| | Midazolam | X | X | | | | | | | | |
| | Zolpidem | | X | | | | | | | | Nur für Schlaflabore. |
| Hypophysenhormone | Oxytocin | X | | | | | | | | | Siehe auch Gynäkologika |
| Impfstoffe | | | | | | | | | | | Siehe Sera/Impfstoffe |
| Infusionslösungen | Elektrolyte | X | | | | | | | | | |
| | Elektrolyte + Glucose | X | | | | | | | | | |
| | Gelatinepolysuccinat | X | | | | | | | | | |
| | Glucose | X | | | | | | | | | Siehe auch Antihypoglykämika |
| | L-Arginin-HCl | | | | | | | | | | Siehe Diagnostika |
| | Mannitollösung | X | | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--|-------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | NaCl | X | | | | | | | | Siehe physiologische Kochsalzlösung |
| | Natriumhydrogencarbonat | X | | | | | | | | |
| | Physiologische Kochsalzlösung | X | | | | | | | | Siehe auch Spüllösungen. Nicht im Zusammenhang mit der Arthroskopie und/oder der Dialysebehandlung. |
| | Ringerlactatlösung | X | | | | | | | | |
| | Ringeracetatlösung | X | | | | | | | | |
| | Ringerlösung | X | | | | | | | | Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten) |
| Kardiaka | Digitoxin | X | X | | | | | | | |
| | Digoxin | X | | | | | | | | |
| Keratolytika / Warzenmittel | | | | | | | | | | Zulässige Wirkstoffe siehe Dermatika und Gase |
| Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren | | | | | | | | | | Vorgefüllte Patronen bzw. Fertigspritzen nur, wenn diese nicht teurer als Durchstechflaschen sind. Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden. |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------------|---|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Koronarmittel | Glyceroltrinitrat | X | X | | | | | | | Keine Retardformen |
| | Isosorbiddinitrat | | X | | | | | | | Keine Retardformen |
| Laxantia | Glycerol (+ Kombinationen) | | | | X | | | | | Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe |
| | Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat) | | | | X | | | | | Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe. Cave: Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065 |
| | Sorbitol (+ Kombinationen) | | | | X | | | | | Nur zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenzten Anschluss an diagnostische und therapeutische Eingriffe |
| Lokalanästhetika | Articain | X | | | | | | | | |
| | Articain + Epinephrin | X | | | | | | | | |
| | Bupivacain | X | | | | | | | | |
| | Bupivacain + Epinephrin | X | | | | | | | | |
| | Chloroprocain | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|---------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Gleitgele mit Lokalanästhetikum | | | | | | | X | | Siehe auch medizinisch-techn. Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Gynäkologie und Urologie |
| | Lidocain | X | | | | | | X | | Externa: Gel, Spray, Lösung |
| | Lidocain + Epinephrin | X | | | | | | | | |
| | Lidocain + Prilocain | X | | | | | | X | | Externa: Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme |
| | Lidocain + Ropivacain | X | | | | | | | X | nur zur Tumescenz-Lokalanästhesie; nur dann, wenn andere Lokalanästhetika keinen gewünschten Zusatznutzen, wie die langanhaltende Analgesie erbringen; nur als Rezeptur erhältlich |
| | Lidocain 10 % + Tetracain 7 % | | | | | | | X | X | Nur als Rezeptur erhältlich |
| | Mepivacain | X | | | | | | | | |
| | Prilocain | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------------------------|------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Prilocain + Epinephrin | X | | | | | | | | |
| | Ropivacain | X | | | | | | | | |
| Lösungsmittel | | | | | | | | | | Siehe auch Spüllösungen und Infusionslösungen |
| | Aqua ad injectabilia | X | | | | | | | | Zur Rekonstitution |
| Migränemittel | Frovatriptan | | X | | | | | | | |
| | Sumatriptan | X | X | | X | | X | | | Nasal: Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren |
| Mineralstoffe | Calcium | X | | | | | | | | |
| | Magnesium | X | | | | | | | | Nur für gynäkologische und kardiologische Indikationen |
| Mund- und Rachen-therapeutika | PVP-Iod (Povidon-Iod) | | | | | | | | | Siehe Dermatika |
| Muskelrelaxantien | Atracuriumbesilat | X | | | | | | | | |
| | Baclofen | X | | | | | | | | Nur 0,05 mg Amp. zur Diagnostik |
| | Cisatracurium | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|----------------------|-----------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|-----------|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Dantrolen | X | | | | | | | | |
| | Diazepam | X | X | | X | | | | | |
| | Mivacurium | X | | | | | | | | |
| | Pridinol | X | | | | | | | | |
| | Rocuroniumbromid | X | | | | | | | | |
| | Suxamethonium-chlorid | X | | | | | | | | |
| | Vecuroniumbromid | X | | | | | | | | |
| Narkosemittel | Alfentanil | X | | | | | | | | |
| | Desfluran | | | | | | X | | | |
| | Esketamin | X | | | | | | | | |
| | Etomidat | X | | | | | | | | |
| | Fentanyl | X | | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------|---------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|--|-----------|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Isofluran | | | | | | X | | | |
| | Ketamin | X | | | | | | | | |
| | Lachgas | | | | | | X | | Ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten | |
| | Propofol | X | | | | | | | | |
| | Remifentanil | X | | | | | | | | |
| | Sevofluran | | | | | | X | | | |
| | Sufentanil | X | | | | | | | | |
| | Thiopental | X | | | | | | | | |
| Ophthalmika | | | | | | | | | Verordnungsfähig sind auch Augensalben mit den gelisteten Wirkstoffen | |
| | Acetylcholinchlorid | X | | X | | | | | Lösung zur intraokularen Instillation | |
| | Atropin | | | X | | | | | | |
| | Acetazolamid | X | X | | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|---------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Azithromycin | | | X | | | | | | Nur zur Instillation in den Tränenkanal |
| | Bibrocathol | | | X | | | | | | |
| | Bromfenac | | | X | | | | | | Außer Handel, dafür Nepafenac |
| | BSS | | | | | | | | | Siehe auch Spüllösung |
| | Carbomer | | | X | | | | | | Nur für Kontaktglasuntersuchungen; CAVE: Preis oft über Festbetrag |
| | Ciprofloxacin | | | X | | | | | | Siehe auch Antibiotika/Otologika |
| | Cyclopentolat | | | X | | | | | | |
| | Dexamethason | | | X | | | | | | |
| | Dexamethason + Gentamycin | | | X | | | | | | Nur zur postoperativen Anwendung |
| | Dexpanthenol | | | X | | | | | | Nur Augensalbe, nur für Augenverbände |
| | Diclofenac | | | X | | | | | | |
| | Dorzolamid | | | X | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|----------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Epinastin | | | X | | | | | | |
| | Fluorescein | | | X | | | | | | Keine Ampullen , da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz-angiographische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund) |
| | Fluorescein + Oxybuprocain | | | X | | | | | | |
| | Fusidinsäure | | | X | | | | | | |
| | Ganciclovir | | | X | | | | | | |
| | Gentamicin | | | X | | | | | | |
| | Hyaluronidase | X | | | | | | | | |
| | Hydrocortison | | | X | | | | | | |
| | Hypromellose | | | X | | | | | | CAVE: Preis oft über Festbetrag |
| | Kanamycin | | | X | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|---------------------------|------------------|------|--|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Lidocain | | | X | | | | | X | Nur zur Katarakt-OP als sog. L4EDO-Rezeptur (Lidocain 4% + Hypromellose 2% in Aqua ad injectabilia) |
| | Latanoprost | | | X | | | | | | |
| | Mitomycin C | X | | | | | | | X | Fertigspritze 0,02 % 0,2ml bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich. Cave: Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten! |
| | Natamycin | | | X | | | | | X | |
| | Nepafenac | | | X | | | | | | |
| | Ofloxacin | | | X | | | | | | |
| | Oxybuprocain | | | X | | | | | | |
| | Phenylephrin | | | X | | | | | | |
| | Phenylephrin + Tropicamid | | | X | | | | | X | Nur zur Anwendung bei Frühgeborenen und Kleinstkindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, nur als Rezeptur erhältlich |
| | Pilocarpin | | | X | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-------------------|---------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Povidon | | | X | | | | | | CAVE: Preis oft über Festbetrag |
| | Prednisolon | | | X | | | | | | |
| | Proparacain | | | X | | | | | | |
| | Proxymetacain | | | | | | | | | Siehe Proparacain |
| | PVP-Iod | | | X | | | | | X | Nur als Rezeptur erhältlich |
| | Spüllösungen | | | | | | | | | Verordnungsfähige Spüllösungen siehe Spüllösungen |
| | Scopolamin | | | X | | | | | | |
| | Tetracain | | | X | | | | | | Nur zur Katarakt-Op., auch EDO (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP) |
| | Tetryzolin | | | X | | | | | | Zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges |
| | Timolol | | | X | | | | | | |
| | Tropicamid | | | X | | | | | | |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|------------------------|--|------------------|------|--|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentrop./-slb. Nasentrop./-slb. Ohrentrop./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Otologika | Acid. Salicylicum, Glycerin, Ethanol | | | X | | | | | X | Nur als Rezeptur erhältlich |
| | Ciprofloxacin | | | X | | | | | | Auch als Rezeptur; siehe auch Antibiotika/Ophthalmika |
| | Ciprofloxacin + Hydrocortison | | | X | | | | | X | Nur als Rezeptur erhältlich |
| | Ciprofloxacin + Fluocinolon | | | X | | | | | | |
| | Dexamethason + Cinchocain | | | X | | | | | | |
| | Lidocain-DMSO | | | X | | | | | X | Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell |
| | Miconazol | | | X | | | | | X | Nur als Rezeptur erhältlich |
| | Polymyxin + Bacitracin | | | X | | | | | X | Nur HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum |
| | Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison | | | X | | | | | X | Zur Behandlung der Otitis externa, z.B. Polyspectran HC ; max. 3x25g pro Arzt und Quartal. Für HNO-Ärzte: Keine Mengenbegrenzung |
| Parkinsonmittel | Biperiden | X | | | | | | | | Siehe auch Antidota |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|-----------------------------|----------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Protonenpumpenhemmer | Omeprazol | X | | | | | | | | Nur bei akuter Ulkusblutung |
| | Pantoprazol | X | | | | | | | | Nur bei akuter Ulkusblutung |
| Psychopharmaka | Amitriptylin | X | | | | | | | | |
| | Doxepin | X | | | | | | | | |
| | Fluspirilen | X | | | | | | | | Nur 10 Ampullen á 1,5mg pro Arzt und Quartal, keine Stechampullen |
| | Haloperidol | X | X | | | | | | | Keine Depotformen; oral:Tropfen |
| | Levomepromazin | X | X | | | | | | | Oral:Tropfen |
| | Olanzapin | X | | | | | | | | |
| | Promethazin | X | X | | | | | | | Auch als Antiallergikum und Antiemetikum |
| | Sulpirid | X | | | | | | | | Eine i.v.-Applikation wird wegen mangelnder klinischer Erfahrungen nicht empfohlen; auch als Antiemetikum / Antivertiginosum |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|--------------------|------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Rezepturen | | | | | | | | | | Siehe § 4 Abs. 1 SpBV: Rezepturen mit Wirkstoffen, die in dieser Anlage gelistet sind, sind als SSB verordnungsfähig, vorausgesetzt es stehen keine Fertigarzneimittel zu Verfügung oder die Rezeptur ist nicht mit Mehrkosten verbunden. Wirkstoffe, für die keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind mit einem Kreuz in der Spalte „Rezeptur“ gekennzeichnet. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit von Rezepturen finden Sie in der Spalte Anmerkungen zum jeweiligen Wirkstoff.. |
| Rhinologika | Argentum nitricum | | | | | | | X | X | Nur als Rezeptur zur Blutstillung bei Epistaxis |
| | Adrenalin (Epinephrin) | | | | | | | X | | Zur Blutstillung bei Epistaxis, s. Antihypotonika |
| | Naphazolin | | | X | | | | X | X | Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/Nasendoskopie, als Zusatz zu Lokalanästhetika, auch als Rezeptur. Siehe auch Urologika. Übrige Anwendungen: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen. |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | Tetracain | | | X | | | | | X | Nur als Rhinologika |
| | Xylometazolin | | | X | | | | X | X | Siehe Naphazolin |
| Schilddrüsen-therapeutika | Natriumperchlorat | | | | | | | | | Siehe Diagnostika |
| Sera / Impfstoffe | Aktive Impfstoffe | | | | | | | | | Siehe Schutzimpfungsvereinbarung |
| | Anti-Rh-D-Immunglobulin | X | | | | | | | | |
| | Diphtherie-Immunglobulin | X | | | | | | | | |
| | Tetanus-Immunglobulin | X | | | | | | | | Nicht bei Arbeitsunfällen |
| Spasmolytika | Atropin | X | | | | | | | | Siehe auch Ophthalmika + Antidota |
| | Butylscopolamin | X | | | | | | | | |
| | Tropium | X | | | | | | | | |
| Spüllösungen | | | | | | | | | | Nur nach den Arzneimittelrichtlinien verordnungsfähige Spüllösungen |
| | Aqua ad injectabilia | | | | | | | X | | Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung nach EBM enthalten) |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|--|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| | BSS | | | | | | | X | | Siehe auch Ophthalmika |
| | NaCl | | | | | | | | | Siehe Physiologische Kochsalzlösung |
| | Physiologische Kochsalzlösung | | | | | | | X | | Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten) |
| | Polihexanidlösung | | | | | | | X | | Nur Arzneimittel (z.B. Serasept); auch als Rezeptur Siehe auch Dermatika |
| | Ringerlösung | | | | | | | X | | Nicht im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten) |
| | Sorbitol + Mannitollösung | | | | | | | X | | |
| Thrombozytenaggregationshemmer | | | | | | | | | | Nicht bei interventionellen Eingriffen, da mit der Leistung abgegolten (Kap. 40.6 EBM) |
| | ASS (Acetylsalicylsäure) | X | X | | | | | | | |
| | Clopidogrel | | X | | | | | | | Nur als Initialdosis für Patienten mit akutem Koronarsyndrom: akutes Koronarsyndrom mit/ ohne ST-Strecken-Hebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-Wave-Myokardinfarkt), in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS); siehe Fachinfo. |
| | Ticagrelor | | X | | | | | | | Nur als Initialdosis |

| Indikationsgruppe | Wirkstoff | Darreichungsform | | | | | | | Rezeptur | Anmerkung |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------|---|--------|---------|-----------|--------|----------|---|
| | | Parenteral | Oral | Augentropf./-slb. Nasentropf./-slb. Ohrentropf./-slb. | Rektal | Vaginal | Inhalativ | Extern | | |
| Trägerlösungen | | X | | | | | | | | Siehe Infusionslösungen/Spüllösungen/Lösungsmittel |
| Tuberkulosemittel | | | | | | | | | | Siehe Antibiotika |
| | Tuberkulintest | | | | | | | | | Siehe Diagnostika |
| Urologika | | | | | | | | | | Siehe auch Diagnostika |
| | Naphazolin | | | | | | | X | | Siehe Rhinologika; bei Blasenspülungen und Zystoskopien |
| | Gleitgele mit Lokalanästhetikum | | | | | | | X | | Siehe auch medizinisch-technische Mittel Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte. Siehe auch Gynäkologika und Lokalanästhetika. |
| Venentherapeutika | Polidocanol | | | | | | | | | Siehe Hämorrhoidenmittel |
| Verdünnungslösungen | | | | | | | | | | Siehe Lösungsmittel |
| Wundtherapeutika | | | | | | | | | | Siehe Dermatika |

Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

| Medizinisch-technische Mittel | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Abdruckmaterial | Gips oder andere Werkstoffe | |
| Antithrombosestrümpfe | zur Mehrfachanwendung | Nur in Zusammenhang mit ambulanten Op's, nicht zum Verbleib beim Patienten |
| Bestecke zur Epidural- bzw. Periduralanästhesie | Einmalbestecke | |
| Bestecke zur Plexusanästhesie | Einmalbestecke | |
| Biopsie-Nadeln/Punktionsbestecke | Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke | Keine Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungs-nadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; auch Biopsie-systeme, wenn nicht teurer als Einmalbiopsienadeln für den Schussapparat |
| Drainageschläuche, -saugeräte | | |
| Dreiwegehähne | | Keine Mehrwegebänke |
| Dünndarmsonden | | Nur zur Diagnostik |
| Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter | bis zur einer Maximallänge von 100 cm | |
| Führungsdraht für Venenkatheter | | Nicht bei Linksherzkatheteruntersuchungen und Rekanalisationsbehandlungen (Kostenpauschalen nach Kap. 40.6 BMÄ/E-GO) |
| Gleitmittel ohne Arzneistoff | auch Vaseline für rektale Untersuchungen | Nur für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall. Siehe auch Wirkstoffliste |

| Medizinisch-technische Mittel | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|---|--|
| Hautstanzen | Einmal-Hautstanzen | Keine Curetten |
| Hodensuspensorien | | Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen |
| Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder | Einmal-Infusionsbestecke | Auch Einmaltransfusionbestecke |
| Infusionsfilter | | Nur zur Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt. |
| Infusionsnadeln | Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen | Butterfly-/Flügelkanülen: nur zur Infusion, nicht zur Injektion u. Blutentnahme; auch Sicherheitsinfusionsnadeln (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe“ (TRBA 250) |
| Injektions-/Infusionsnadeln für Portsysteme | | |
| Katheter | Embolektomiekatheter, Galaktographiekatheter, Hysterosalpingographiekatheter, Sialographiekatheter, Verweilkatheter (Harnblasen-Ballon-K., suprapubische Harnblasenk., Nephrostomiek.) | Ausschließlich die genannten Katheter; Verweilkatheter einschließlich Verschlussstopfen; suprapubische Harnblasenkatheter einschließlich Spaltkanülen |
| Kirschnerdrähte | | |
| Magensonden | | Nur zur Diagnostik |
| Mandrins | | |
| Mundspatel | | Nur unsteril |

| Medizinisch-technische Mittel | Spezifikation | Anmerkungen |
|---|--|---|
| Nahtmaterial, chirurgisches | Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe | Siehe auch Wundklammern; keine Implantate (z. B. PDS-Folie®,...); keine Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien |
| Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie | Einmal-Nervenstimulationskanülen | Keine Elektroden |
| Patientenschläuche für Medizinpumpen | | Keine Verlängerungsschläuche |
| Paukenröhrchen | | |
| Perfusionsbestecke | Einmalperfusionsbestecke | Keine Einmalspritzen wie Perfusor-/Infusorspritzen) |
| Punktionsbestecke | | Siehe Biopsienadeln |
| Rückschlagventile | | Nur für Infusionsbestecke |
| Sauerstoffatemmasken und Sauerstoffnasensonden / -brillen | Einmalprodukte | Zur Therapie hypoxämischer Zustände |
| Sekretbeutel | | Nur zur Gallen- und Wunddrainage |
| Spezialkanülen zur Anästhesie | | Siehe unter: Bestecke zur Epiduralanästhesie, Bestecke zur Plexusanästhesie, Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie, Spinalkanülen, TIVA-Sets |
| Spinalkanülen | Einmal-Spinalkanülen | |
| Stomapaste | | Nur für Urologen |

| Medizinisch-technische Mittel | Spezifikation | Anmerkungen |
|--|---|---|
| Thermotherapie: Packungen zur Thermotherapie | Paraffine, Peloide/Fango | Soweit nicht mit den Vergütungssätzen nach BMÄ/E-GO abgegolten, nur zur Anwendung in der Praxis, keine Kalt-Warm-Kompressen |
| TIVA-Sets | | Nur wenn ausschließlich Einzelbestandteile nach dieser Anlage enthalten sind; Verordnung nur durch Anästhesisten |
| Untersuchungsfingerlinge | | |
| Urostomiebeutel | einteiliges System | Nur für Urologen, nur Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung |
| Urinauffangbeutel | | Nur zur Uringewinnung bei Kindern |
| Vakuumflaschen mit Überleitungsbesteck | Einmal-Vakuumflaschen | Nur zur Wunddrainage, zum therapeutischen Aderlass und zur Aszitesbehandlung |
| Verschlussstopfen | für Drainageschläuche, Infusionsbestecke und Katheter | |
| Wattestäbchen | | Nur unsteril |
| Wundklammern | | Keine Geräte zum Setzen von Klammern wie Klammerpistolen, Einmalklammerpistolen u. ä.; keine Meniskusfixationsmaterialien |
| Zungenläppchen | | |

Verbandstoffe

| Verbandstoffe | Spezifikation | Anmerkung |
|-------------------------------------|---|---|
| Augenwatte | | |
| Binden | | Siehe unter: dauerelastische Binden, elastische Binden, Gazebinden, Idealbinden, Mullbinden, Papierbinden, Polsterbinden, Schaumstoffbinden, Tamponadebinden, Zinkleimbinden |
| Dauerelastische Binden | | Nur wenn nicht teurer als normale Idealbinden |
| Elastische Binden | | Nur solche, die so vom Hersteller gekennzeichnet sind |
| Endloswindeln | | Nur als Vorlage nach operativen Eingriffen |
| Ergänzungsmaterial für Gipsverbände | Gummiabsätze, Gehbügel, Gehstollen, Gehsohlen | Keine Gehschuhe |
| Fingerschienen | | Nur Stacksche Fingerschiene und Aluband (auch Fingerschienen mit Alukern, z. B. Chrisofix®) |
| Fingerverband / Zehenverband | | |
| Folienverband | | |
| Gazebinden | | |
| Gewebekleber | auch Knochenwachs | |
| Gips | | |
| Gipsbinden | | |

| Verbandstoffe | Spezifikation | Anmerkung |
|-----------------------------------|---|--|
| Gipsöl | zur Anfertigung von Liegeschalen und Gipsbetten | |
| Halskrawatten | | Nur Meterware |
| Hydrokolloidverbände | Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine, Calciumalginaten und/oder Pektinen, keine Schaumstoffwundaufkl. | Nicht zur Versorgung chronischer Wunden! Alle anderen Verbandstoffe oder Kompressen zur feuchten Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu erfolgen |
| Idealbinden | | Nur unsterile |
| Klettverschluss inkl. Flauschband | nur als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen | |
| Kompressen | Kollagen-, Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen | Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung; siehe auch Hydrokolloidverbände |
| Mullbinden | | |
| Netzverbände | Verbände zur Fixierung von Wundauflagen | |
| Papierbinden | | |
| Pflaster | Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage | Keine Sprühpflaster oder Verbandssprays, Silikonpflaster nur eine Packung pro Quartal |
| Polster | | Nur unter Gips- und Kompressionsverbänden |
| Polsterbinden | | Nur unter Gips- und Kompressionsverbänden |
| Rucksackverbände | nur als Meterware | |
| Schaumstoffbinden | | |

| Verbandstoffe | Spezifikation | Anmerkung |
|-----------------------------|--|--|
| Schlauchverbände | | Nur als Meterware, keine Fertigabschnitte |
| Schnellverbände | | |
| Stahlwolle | für Kompressionsverbände | |
| Stützverbände | Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen. | Synthetische Stützverbände: nur für langfristig liegende Ruhigstellungsverbände von mehr als vier Wochen und für Kinder bis zum vollendetem 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen; |
| Tamponadebinden | Nur Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull. | Sterile und unsterile; |
| Tamponaden | Nur Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme | keine Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: nur HNO-Ärzte, nur zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op. |
| Tamponadestreifen | Nur Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull. | Sterile und unsterile; |
| Tapeverbände | | Kein Kinesiotape |
| Tupfer | | Sterile und unsterile, keine Alkoholtupfer |
| Uhrglasverbände | | Nur zur Notfallversorgung |
| Verbandklammern | | Keine Klettverschlüsse; siehe auch Pflaster |
| Verbandschienen nach Cramer | | |

| Verbandstoffe | Spezifikation | Anmerkung |
|------------------------|---|---|
| Verbandstoffe | Mull und Gaze, auch selbstfixierend und selbstklebend, auch mit Arzneistoffen imprägniert | Zur feuchten Wundbehandlung: nur Hydrokolloidverbände (siehe dort); siehe auch Pflaster; keine Verbandstoffe mit Aktivkohle |
| Verbandwatte | | Siehe auch Augenwatte |
| Wundverschlussstreifen | | |
| Zinkleimbinden | | |